

## GABARITO - PROVA INTERVENÇÃO

### Questão Resposta

- 1 French (F)
- 2 Entra em contato com médico solicitante e sugere realizar o procedimento após a correção do INR, pois trata-se de um fator de risco evitável.
- 3 Tru-cut
- 4 Artéria em colar de contas.
- 5 12 horas antes do procedimento.
- 6 Repetir a punção em 3 meses, pois existe grandes chances do resultado ser satisfatório.
- 7 Drenagem do tórax com dreno valvulado e internação para observação por 24 horas.
- 8 Biópsia transretal da próstata guiada por ultrassom e auxiliada por imagem de ressonância magnética em tempo real.
- 9 Bilirrubina sérica total acima 2,0 mg/dl.
- 10 Estabilidade.
- 11 Punção inadvertida da artéria epigástrica.
- 12 Tratamento clínico com droga sistêmica.
- 13 Dreno pigtail posicionado no interior da via biliar e com drenagem unidirecional para bolsa coletora.
- 14 Drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por ultrassom e instalação de dreno pigtail como terapia ponte para o tratamento definitivo.
- 15 0,5 ml/ min.
- 16 Implante de stent revestido.
- 17 Diâmetro interno.
- 18 O uso de dosímetro é obrigatório a todos os profissionais com risco de exposição à radiação ionizante.
- 19 Tecido neoplásico viável remanescente, nova TACE.
- 20 Michaelson
- 21 Punção com dilatador, passagem do fio guia, retirada do dilatador, passagem do cateter e saque do fio guia.
- 22 Fratura de arco costal.
- 23 Stanford B.
- 24 20.000 e 1,5
- 25 Exame realizado em equipamento de angiografia e avalia drenagem venosa do pênis flácido e ereto.
- 26 O alívio de sintomas ocorre em 80 – 90 % dos casos.
- 27 Cutâneo e pleural.
- 28 1500 ml.
- 29 Ascite refratária.
- 30 Trajeto intrapulmonar superior a 4 cm.